

1er décembre 2012

Journée mondiale contre le sida



1er décembre 2012

Journée mondiale contre le sida

1. Combien y a-t-il eu de nouvelles contaminations VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine)/SIDA dépistées en 2010 en France ?

- A 2500
- B 6300
- C 10500

2. En France, les nouvelles contaminations se produisent le plus souvent dans le cadre de

- A rapports homosexuels
- B l'usage de drogues injectables
- C rapports entre personnes de sexe opposé

3. En France, un jeune de 16 à 24 ans est contaminé par le VIH en moyenne

- A toutes les douze heures
- B toutes les semaines
- C tous les mois

4. Dans le cadre de la maladie du SIDA, le terme « séropositif » signifie

- A porteur du VIH mais qui ne peut pas le transmettre à une autre personne
- B porteur du virus du SIDA (VIH) avec ou sans signe de la maladie

5. Comment peut-on être contaminé par le VIH ? (plusieurs réponses possibles)

- A en embrassant quelqu'un
- B en ayant un rapport sexuel non protégé
- C en se faisant piquer par un moustique
- D lors d'un rapport bucco-génital
- E en buvant dans le verre de quelqu'un d'autre
- F en touchant du sang contaminé

6. Avec les derniers traitements contre le VIH

- A les personnes séropositives peuvent guérir du SIDA
- B les personnes séropositives prennent un médicament de temps en temps si elles se sentent fatiguées
- C les personnes séropositives qui ont commencé un traitement doivent le prendre à vie
- D les effets indésirables n'existent plus

7. On ne peut pas être contaminé par le VIH-SIDA si :

- A la femme prend une pilule contraceptive
- B la femme utilise un spermicide
- C l'un ou l'autre des partenaires utilise un préservatif
- D les partenaires n'ont jamais eu de relations sexuelles
- E l'homme se retire avant d'éjaculer

8. Pour une meilleure protection, peut-on utiliser le préservatif masculin en même temps que le préservatif féminin ?

- A oui
- B non

9. Lorsqu'on pense avoir pris un risque :

- A on attend des signes de la maladie
- B on se lave à l'eau très chaude pour éliminer le virus
- C on se rend dans un hôpital le plus rapidement possible pour évaluer la possibilité de prendre un traitement d'urgence

10. Pour quelle raison principale est-il si difficile de mettre au point un vaccin contre le VIH ?

- A parce que le virus change de forme sans arrêt
- B parce que le virus est impossible à étudier au microscope
- C parce que le virus se comporte différemment selon la personne infectée

Réponses au dos

1er décembre 2012

Journée mondiale contre le sida

Réponses

1 : B 6300

En 2010, en France, 6300 personnes ont découvert leur séropositivité. Au total, 150 000 personnes vivent avec le VIH/SIDA en France.

2. C rapports entre personnes de sexe opposé
Parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité en 2010, on estime que 58 % ont été contaminées lors de rapports hétérosexuels, 40% lors de rapports homosexuels et 1 % par usage de drogues injectables. 33 % des personnes nouvellement contaminées sont des femmes.

3. A Toutes les douze heures

En France, en 2010, 12 % des personnes nouvellement contaminées ont moins de 24 ans

4. B. Porteur du virus du SIDA (VIH) avec ou sans signe de la maladie

Dans le cadre de la maladie du SIDA, séropositif signifie être contaminé par le VIH. Le SIDA est le stade le plus grave et le plus élevé de cette infection

5. B En ayant un rapport sexuel non protégé et **C** Lors d'un rapport bucco-génital

Le virus vit à l'intérieur de certaines cellules du corps, qui sont présentes dans le sang et les sécrétions sexuelles. Les modes de transmission du virus VIH sont les suivants :

- les rapports sexuels non protégés avec pénétration vaginale, anale ou buccale

- l'exposition à du sang contaminé par le VIH lors du partage de matériel d'injection en cas d'usage de drogues injectables, en cas de piqûre accidentelle chez un professionnel de santé, ou par une transfusion de sang (avant 1985)

- de la mère à l'enfant lors de la grossesse ou par l'allaitement

1er décembre 2012

Journée mondiale contre le sida

6. C Les personnes séropositives qui ont commencé un traitement doivent le prendre à vie
La multithérapie permettant de lutter contre le virus du SIDA consiste en un traitement à vie devant être pris impérativement tous les jours avec des effets secondaires parfois lourds.

7. C l'un ou l'autre des partenaires utilise un préservatif

La meilleure protection reste le préservatif quand il est bien utilisé !

8. B non

On ne peut pas utiliser 2 préservatifs en même temps, qu'ils soient masculin ou féminin sinon ils risquent de se déchirer !

9. C on se rend dans un hôpital le plus rapidement possible pour évaluer la possibilité de prendre un traitement d'urgence

Effectivement, en cas de prise de risque, le mieux est de se rendre très vite dans un hôpital pour qu'un médecin évalue l'opportunité d'un traitement d'urgence (traitement post-exposition).

10. A parce que le virus change de forme sans arrêt

Pour échapper aux défenses de notre organisme, le VIH "change de visage" en modifiant les éléments présents à sa surface. Ce caractère changeant rend très difficile la mise au point d'un vaccin efficace qui nécessiterait d'enregistrer un "portrait robot" du virus.

Sources : Institut de veille sanitaire (InVS)
ONUSUDA
INSERM

Les réponses aux questions ont été validées par les médecins coordonnateurs nationaux des ministères économiques et financiers et par un médecin du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat



1er décembre 2012

 **Journée mondiale contre le sida**



6300 nouveaux séropositifs par an en France

c'est 6300 contaminations de trop

